庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷三百七十九

編修臣倉聖脈覆勘 詳校官本醫院恩糧臣孔纸秀 總校官進士臣終 校對官修撰臣吳錫齡 膽録舉人臣薛炳文

琪

體黃間承咬苦焦渴自汗尿白鴻酸肚 胃受傷致之同實而異名也拍 如鼻乾口暖唇白雨眼昏爛 十歲以上其病為勞 周王朱橚 撰

欽定匹庫全書 致也盖其血氣未定乳哺有傷易生壅滞内有滞熱未 發渴齧齒虚驚是調心拍 赤唇紅口舌生瘡胸腸煩悶小便赤澁五心皆熱盜汗 得疏通故心神驚鬱而作驚疳之候外證身體壯熱臉 風寒內傷喜怒邪氣未徹遽爾乳兒多成風疳風入眼 肝臟受熱所致也若乳母寒暄不調滋味不節或外感 飯者其候也 脹腸鳴癖結潮熱酷嗜爪果鹹炭生米泥土而飲水吐 心疳即驚疳由乳食不調心臟受熱所 卷三百七十九 肝疳即風疳由乳食不調

之狀如孤感傷寒齒蝕之證或以走馬命名盖齒屬腎 提心下擾問若上蝕齒断則口瘡出血齒色緊黑下蝕 致也凡甘味入於脾而動蟲蟲動則掃飪臟腑遂使孩 癬是調肝疳 腸胃則下利肛爛濕痒生瘡療治不蚤肌體消耗難以 有瘳蟲者蛋也目為濕蛋多因府傷又痢腸胃受濕得 淚多頭焦髮立筋青腦熱甲痒筋雞躁渴汗多下痢瘡 腫翳生的涕是調疳眼外證搖頭樣目白膜遮睛眼青 腎疳即急疳由乳食不調臟腑伏熱所

久足四車公野

普濟方

氣名曰臭口次第齒黑名曰崩砂盛則断爛名曰潰槽 金万にけんいか 時來滑泄肚痛口臭乾渴齒斷生瘡爪黑面黧身多瘡 腐縱得全活齒不復生外證腦熱肌削手足如水寒熱 熱血迸出名曰宣露甚者齒皆脱落名曰屬根其根既 虚客於皮毛入於血脉故鼻下两傍赤痒瘡濕是為鼻 於是謂腎疳 致也肺主乎氣 鼻乃肺氣所通其氣不和則風濕東 主筋総受熱邪疳氣直奔上焦故以走蝕為喻初作 肺疳即氣疳由乳食不調壅熱傷肺所

疳 塊亦名妳疳外證面黄身瘦肚大脚細吐逆中滿之力 氣脹毛焦泄利頻併是調肺疳 府瘡鼻不通汁所流處即成瘡亦名疳蛋外證效嗽喘 節脾胃受傷所致也或乳母恣食生冷肥膩或乳児過 逆壯熱惡寒皮膚栗生鼻痒流涕咽喉不利順爛睡紅 哭啼水殼不消泄下酸臭合面因睡减食與泥是謂 飽或飯後與乳致使吐乳多脹久則變為乳癖腹脇結 析而論之日五疳出蟲曰蛔疳曰香疳曰腦疳曰 脾疳即肥府由乳食不

欠足四年八島

曹齊方

鼻出者難治香疳者蟲蝕春齊身弱羸黃積中生熱煩 |蓄甜腻化為蛔蟲皺眉多啼嘔吐清沫腹中作痛肚脹 青筋唇口紫黑寫頭齒痒是也蛔雖食蟲不可動從口 醫青黑則難療也蛔疳者失乳飯食內太早或腸胃停 馬尾多有此積者皆於頭項腹背之間黃白或亦者可 乾疳曰疳渴曰疳漏曰疳腫脹曰疳勞曰無辜疳曰丁奚 不調然臟腑停積已久莫不化而為蟲或如絲髮或如 曰哺露證狀非一 五疳出蟲者疳傷之源雖起於乳餔

一金分に屋石書

巻三百七十

急滿頭进瘡腦如火髮結如穗編身多汗顋腫頗高是 脫乾渴其病在脾総為乾疳是也疳渴者臟中風有疳 温 也乾疳者聲焦皮燥大便乾結其病在肺搭伏癡眠腦 氣 甲是也腦疳者胎中素挾風熱生下乳餔越常頭皮光 煩渴引飲乳食不進夜則渴止是也疳瀉者毛枯唇白 一青紋肚脹腹鳴寫下糟粕是也勿用熱藥止之疳痢 下痢拍背如鼓鳴者骨如鋸齒或十拍皆瘡頻嚙爪 加乳母恣食五辛酒麵炙燒使小児心腹壅熱日 ブルンルー 語科方

當磨積調氣疳勞者潮熱往来五心煩熱手足心及腦 前熱而發瘡盗汗骨蒸嗽喘枯悴是也或渴而復寫飲 腹肚緊脹由是脾復受濕故令頭面脚手虛浮是也法 粉不速破之則蟲隨熱氣流散溫蝕臟腑以致肢體癰 項選有核如彈子按之轉動軟而不疼其間有蟲如米 水惡食肚硬如石面色如銀斷不可活無辜疳者腦後 下惡物是也疳腫脹者虚中有積其毒與湿交并故令 者挾受風寒暑濕冷熱不調或停積宿滯水穀不聚頻

一致定匹庫全書

冬三百七十九

向消錄肾氣不足復為風冷所傷使柴骨枯露亦有胎 一般是為丁奚虚熱来往頭骨分開翻食吐蟲煩渴嘔喘 瘡便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高是也針刺破膏藥貼 中受毒臟腑少血致之皆無辜種之疾病而至此不幾 是為哺露皆因脾胃久虚不能化水穀以榮血氣故 J. 5. L. 足極細小骨髙尻削體痿腹大臍突號哭腦陷或生瘕 上或濯兒衣露於簷下為鴻鳥落羽所污兒着此衣蟲 入皮毛亦致無辜之疾兒衣已曬須微火烘之其若手 音季な

一致定匹庫全書 表或者更被風邪入肝以致筋絡放弛吐寫者當調胃 成者有肝膽伏熱面亦唇紅忽變此者有傷寒不及 謂之五軟非也天柱骨倒凡有三種有吐瀉日久羸 殆哉又有小兒父患腎疳内虚不食甚者天柱倒治法 用錢氏地黃丸加驅府等劑仍與貼項强筋不識 肝熱者隨輕重以京肝 成聖 如惠 巻三百七十 Ð 並 一頭强筋 九 耳瘦疳 貼 諸 項惟傷寒天 خ 血 弱

欠己日東台島 来 نن 凡 辛黑肝作無不 不無 煩熱 皆熱疳也冷疳病多在內痢色無常其吻青白肢 1), 味氣臟想完可 消血 有 痩 兒 好色 臉聚疳有 不治 亦 掀衣氣魔飲冷水煩躁卧地肚熱 有腫若時可也瘡可 疳 大 脉不晴腹治若 平 可带脹也下 土 約 き 齶 有若部有 治青 畀 有冷熱二種熱疳之病 也脉時府開竅唇 杰 心左 蝕張 普濟方 痢香 與脇 有 度不脾下若脊時 舸 水可疳硬急十 時 也 亦 治若多治指爛有斷皮受吐之背痒臭作 穀治岩多 驚涎無痒 枯 不氣五 胰啼沫不自 齒色 可 常見於 脚 轧好眼瘥 咬忍斷或 冷潮 飲角 脊漸 也指 肚水左几甲骨軟峭 大更右小髮如欲黑 唇食有児監鋸爛舌 執 外 往 五

故錢氏又曰小児易為虚實脾胃虚不受寒温服寒則 者虚中之冷治熱不可妄表過凉治冷不可峻温縣補 生冷服温則生熱當識此而勿誤上醫處此消積和胃 謂之冷積大抵疳之受氣皆虚使然熱者虚中之熱冷 進滑寫無已亦冷疳也其有寫多膿血日加瘦弱此則 臟腑自然充實取積之法又當權衙積者疳之母由 弱目腫面黧又一證燥渴卧地似有熱狀而飲食不 調氣隨順樂餌以扶之淡薄飲食以養之榮衛調

卷三百七

欠之日中心的 為潮熱之治法解散寒熱即與下癖合是而觀發作不 實而取之若積虚而甚則先與扶胃使胃氣內充然後 聚也先寒後熱飲水不食或飲水以致喘嗽錢氏有癖 胃之劑為之扶虚然取積宜疎利如白豆幾難蔔子縮 砂莲术消疾等般亦不可無肠問癖痛亦虚中之積 為之微利若積勝於虚則先與利道設得一泄急以和 積而虚謂之疳極諸有積者無不肚熱脚冷湏酌量虚 同療治不一 又可無權度於此哉若夫諸疳惡證心疳 普濟方

陌嘔 處乳食 直鴻腫滿不痢腹脇脹疼皮發紫瘡肌肉 |清泄不休脱肛咳逆抱起昏沉手足垂軟足及脚心全 疳學泥泄痢水穀不消唇白腹髙人中滿者不治其或 不知覺項筋舒展身體變冷是則為五絕證候是者胸 疳欬逆氣促順寫白沫身上栗生其色斑黑者不治脾 飲水不已食則驚啼耳邊紋多舌上照黑者不治肝疳 飲水好鹹小便如乳耳焦肩聳牙黑骨枯者不治肺 右脇結硬頻数吐涎目睛青筋眼角黑氣者不治腎疳

金云正是石量

巷 三百

こと十九

设定四車全書 四 危篤矣凡疳在內目腫腹脹利色無常或沫青白漸瘦 光紫與夫府勞渴鴻面楊色瘦骨露齒脹肚不食者皆 補脾益黄散主之腎疳當補腎地黃九主之肺疳當補 弱此冷證也疳在外鼻下赤爛自揉鼻頭上有瘡不痛 府當補肝地黄丸主之心疳當補心定神九主之脾疳當 而漸破鼻瘡達耳此熟證也宜蘭香散白粉散主之肝 疳喜即冷地當補腎地黄散主之諸疳皆當補其母及 肺益黄散主之筋疳源血而瘦當補肝地黄丸主之 普濟方

實下之既過胃中液津耗損漸全疳瘦有病傷寒五六 當補母而寫本臟則愈假令日中發潮熱是心虚熱也 也又有病癖其疾發作寒熱飲水脇下有形硬痛治癖 與治疳藥冷則木香九是脾臟虚也臟實而內發虚即 諸冷樂利之利既多矣不能禁約而津液内亡 即成疳 肝為心母則宜先補肝肝實而後寫心心得母氣而內 之法當漸消磨醫反以巴豆硇砂華下之小児易虚易 而潮熱愈也醫見潮熱妄謂其實乃以大黃牙硝量

金りし

卷三 百七十九

皆有瘡髮髮作穗頭大項細極瘦飲水皆其證也大 甚液津燥損亦能成疳又有肥疳即即疳也身瘦黄虚 諸端因亦成疳病又有吐為父病或醫妄下之其虚益 飲不止而生熱也熱氣內耗肌肉外消他邪相干證變 泥土身有瘡疥瀉青白黄沫水痢色變易腹滿身耳鼻 其端目溢或生白膜唇赤身黄乾或黑喜卧冷地或食 而煩渴引飲小便赤溢更兼有瘡疥其候不一 日間有下證以冷藥下之太過致脾胃液津少即使引 一種種

次之四中五号

普湾方

中氣冷面黃白目無精光或白睛多及多睡少食或大 府凡病可量大小虚實而下之則不至為疳也初病津 和胃白木散主之小便初出微亦良人白濁者乃是熱 液少者當生胃之津液白术散主之津多則愈積痛口 便酸臭者當磨積宜消積丸甚者當用白餅子下之後 冷疳冷者木香九熱者黃連九至冷熱之疳尤宜如聖 疳病當辨冷熱肥瘦其初病者為肥熱疳久病者為瘦 九故小児之臟腑柔弱不可痛擊大下必亡津液而成

欠黄與胃 胃効曳但瘦 九香蟾 便 疳 班拍之新也初黄白久白 濁者乃是冷疳疳之久也 盖乳疳 有召地好骨 如 牛黃九大黃九冷疳益黃散六甲九冷熱之疳蘆會 是疳愚行食 胃 油 食 硃 而肠熱視数泥盗 九小便白濁厚朴九諸失津液成疳參术散 不胃積日里土汗 積 砂 熱喫熱主食乃炭或 丸 脾逢也人已蜕灰時 益黄散補 泥則日如炙紙飲 食 疳土消何飢與 有 全 積而穀知胃食 然 所須故也熱無醫 更於後 以在令愚也效用 不 不要己日好 喫 一千 金或 知訣食素食醫 擇 飢云如問泥以方時 飽脾飢云土疳格乳 用 好疳也食者藥肉食 疳 馬 黄 氏 1食食又己脾服 不 泥土實如疳半斤知腹女 土面鑑飢也年絕飢大五 主姜云者脾無繁飽消歳

日六|也象用其之證|只作累一|自治|次人| 其月後而樂故憶亦口將醫月言之次曰 病方别权亦遂得不雖熟或一學七日何 先退一功共師銭晚飲者作發脖日熟治 心累女樂無其氏諸水小淋半囊平脾也 腹樂十不多意曾書更便治月轉愈府答 積日 者無四必而以用亦編不者一痛 有刻歲多取藥白木不亦小發不張等去 食病與而改投样自在或便十可氏俱胃 臍腹三醫連月此無不止將進青臍散當 下中月者也而少法胰腹冷退吐下補以 者疼一能余疾有以召中者不清疾流黄 膀後發機日已微治愚或小定水痛會土 脱至每變大症炒之性作便似小腳九九 病臍發即兵馬處移視更如此便下香鴻 也下時可不人深時之病常一如透蟾十 |調余|五用火問求思此者|或年|常起|九餘

文三日中山町 食不進漸成羸瘦其候難名上件證候有若熱證但大 宜服露星膏又小児冷疳多渴好卧冷地煩燥啼叫飲 前証同累大戦散送 便滑池有藥不効者是也唯錢氏論此冷疳候宜服木 每服一錢盐湯調下小児爾疳者面色青黃或口內有動看等分微炒為末小児爾疳者面色青黃或口肉大戟前証同累樂以本通滑石之類無助召恩視之用大戟大戟散送下紫九子鴻十餘次即安又一小女三歲與大戟散送下紫九子鴻十餘次即安又一小女三歲與 鋸乃積而生熱成疳也宜服蘆薈九又宜服猪肚丸又 瘡或見乳多睡人則成嫋癖結塊腹中皆乳食不節故 也又有小児疳積者其狀漸黃色拍背如鼓鳴眷骨如 普濟方

祭致成疳也其五疳及諸疳等今以一方同療之故謂 愈自後凡有此證無不獲痊 香丸余用之經驗久矣初因女子以此病方三歲百樂 根本主療皆因乳哺乖宜寒温失節臟腑受病氣血不 夫小児疳者其狀多端雖輕重有殊形證各異而細窮 俱試而無偶中者因閱錢氏方遂合取木香九数服而 金好四月百十 切泊也 治小児一切疳 附論 老三百七十九

てこうこ **青黛散出聖治小児一切疳腹肚脹滿手脚枯細眼目** 口鼻生瘡身體壯熱痢下泔淀日漸羸瘦面無光澤 陸香 青黛細雄黄細珠砂細研水 两 麝香細蚺蛇膽两細辛 石塩研白醬味盡薰 黄連鬚

麝香九治小児一切疳 鼻中 引涎出若鼻内瘡用蒜如皂莢子大研和少散內入 右為散同研令与如疳在内三歲兒服以新井水 疳瘡以蒜一片研和少許散每夜塗之須更自然流 合調下半錢一歲一字三歲已上臨時加之若口內 黄連就青皮好三稜炮我水炮檳榔 蝦養人故 黄葵牌牛分明養人故 金酥黄

, , , , 湯下 米飲下寒熱往来薄荷湯下 痢紫蘇木瓜湯下 右研麝香末拌匀蜜丸量大小米飲湯下 **磐** 炙一 厚朴製川芎 不思飲食縮砂仁湯下 川楝肉 苦楝根 普齊方 退疳熱麥冬湯下 胡黄連 史君子 夜明砂 **重動若棟湯下** 腹脹木香陳皮湯 神妙 蘆香谷五 冷痢丁香 五疳陳 疳

髮作穗壯熱不食多因齒爛鼻瘡疳瘡潮熱腹急骨蒸 欽定匹庫全書 并黄前與方治小児諸疳諸痢食傷氣脹頭大體羸頭 消瘦髮堅面黃 石捣研十六味為末猪膽膏丸如麻子大每服五七 研燕美 皮 蝦基酒一蓋猜猪膽一枚取汁熬成膏 分內直落分秋冬一分牛黄鍋 史君子数胡黃連 熊膽 夜明砂 卷三 百七十九 蟬蛻 丹砂研雄黄 麝香 無食子 訶梨勒 蘆着

久己の中心時 日晚各 右為細末用生猪膽為九如黄米大一服一粒早 湯下 快熱而利者不可服審為九無無美 凡米飲下醬疳金銀薄荷湯下疳瘡腹脹桃仁懷香 獨角山各一枚 乾數 蝉蛇去足蟾酥 大學子去沒青黛所鳥蛇酒浸去麝香而各丹砂 疳蟲東引石榴苦楝根湯下此九尤治疳痢若 服 隔紙 龍腦研雄黃冊順粉分半白附子 普濟方 1 分

金石工戶白書 五疳九好 治小児五疳乳食不成肌膚心腹脹滿或 夜明丹醫方治五疳腹脹目遊多睡 鼻多嚏日漸觀瘦 時下痢壯熱昏沉眼溢口乾愛喫生冷毛髮乾堅揉 石為末都研今勻用三服量児大小以意加減 蝸牛炒食夜明砂鄉頭令性黄五倍子分等 黃連素龍膽頭 苦楝根 白鮮皮然食蝦蟆灰 青焦鄉雄黃細麝香細蘆香所能將所胡黃連 巻三百七十九

ところきんは 保童九和劑治小児五疳盖其骨肉輕軟腸胃微細若 乳哺有節則臟腑相調或乳母寒温失理飲食無常 樂先六治拍後虚熱陰並腫 右以韭菜內地龍真煅為末出火毒清油調傅 下不拘時候量兒大小加减 與 五 枚 焼 存性 已 夜明砂燉胡黃連 處拌勻粳米飯和九如黍米大每服十粒米飲 普齊方 青黛 麝香 草龍膽 苦棟根各半 乾蝦 蘆薈各一、 <u>†</u>

多好四月在書 拜內色青黃髮立頭焦筋青腦熱腹中積聚下痢頓 醉飽喜怒及小児百醉以後五歲以前乳食漸多不 候腹多筋脉喘促氣魔乳食不多心腹脹滿多啼欬 ·朔無常頰亦面黃胸腸煩滿鼻乾心躁口舌生瘡痢 多人而不痊轉甚羸瘦二曰心疳其候渾身壯熱吐 候摇頭揉目白膜遮睛流汗遍身合面而即目中滋 擇生冷好後肥膩甘酸之物即成五疳一日肝疳其 久不痊多下膿血有時盗汗或乃虛驚三曰脾疳其 卷三百七十九

减少為痢類併下部開張肛門不以疳瘡痒痛己 作時口鼻乾燥腦熱如火脚冷如冰吐逆既增乳食 食皮上栗生五曰腎疳其候肌肉消瘦菌断生瘡寒熱 啼呵喉不利揉鼻咬牙肚熱憎寒口鼻生瘡唇邊赤 消口鼻常乾好吃泥土情意不悅愛靜悄明腸胃不 痒腹内氣脹乳食漸稀大腸不調頻頻洩痢糞中出 逆面色萎黄肾立毛燋形枯力劣胸膈壅悶水穀不 和便多酸臭四曰肺疳效嗽氣逆皮毛乾燋饒涕多

とこう 見します

哲病な

ナ

一一多定四月全書 肥兒九治肥熱疳 疾狀並皆治療 石為細末用糯米飯和九如麻子大每服! 蘆普研名 根 黄連看白鱔頭炙令照黄魚門草龍膽去姓黄 青橘皮吐五倍子 不計時候温米飲下日進三服尤妙 天漿子 炒胡黄連 巻三百七十九 夜明砂鄉頭令黃色苦 麝香 青黛斯能膽所 一方有蝎虫 一歳兒一

こうし 右剉将巴豆同炒少時傾去巴豆不用 治小兒寒熱往来欲傳疳候急宜補牌進食磨 氣 消疳又實皮散米飲湯調与空心與服以補益神 蘆薈 青皮好陳皮 川楝肉錢史君子 錢 巴豆皮作二片各五巴豆十五粒去 青黛末鈴三 蝦麻去足焼 去白各 内 `所黄連 野町かり 三稜炮我术 神妙 1 積

一欽定匹庫全書 史君子檳榔九活鄉治嬰孩小兒食肉太早傷及脾胃 藥同為末麵糊丸米湯下凡久積欲傳疳宜作虚中 水穀不分積滯不化痰作拍氣等候宜服之 連蘆薈等治疽藥 精治之虚則補而後取實則取而後補不必便用**胡黃** 右剉一處入銚內再用巴豆微炒去巴豆不用和前 青皮 肉豆卷上質欄相一質直連 川棟子以去蘆薈 巻三百七十九 川芎錢一麝香一 胡黃連 陳皮

時不作風候何也惟疳寫名熱寫其臟腑轉動有限所 以不成風候雖寫不風亦轉也證作渴虛熱煩燥下 不下其積存而臟虚成疳尤重大抵小児患疳泄寫無 温飲下 日積是疳之母所以有積不治乃成疳候又有治積 石為末猜猪膽汁薄荷為丸如麻子每服三五十九

次定四車全書 国

腫滿喘急皆疳候虚證古云疳虚宜補虚是知疳之為

疾不可更用利導之樂以致臟腑皆虚發作之初名

普湾す

中脫自然調貼令氣脉和疳消蟲化漸次安愈若以藥 突名曰丁奚食己嘔熾頭骨分開作遇引飲蟲從口出 色血名日疳勞手足細小項長骨露几屬無肉肚脹臍 虚煩名曰疳熱毛髮結穗肚青大筋好喚異物名曰疳 脱不化亦能成拍治拍之法量候輕重理其臟腑順其 名日哺露此皆疳候又因多食生冷甘粘肥膩積滯中 極受病傳騰已極熱發往来形體枯槁面無神彩肉無 **曰疳氣腹大脹急名曰疳虚瀉痢頻併名曰疳積五心**

白りて

欠足日車公告 政之五臟球怯腸胃不去積毒取出蟲子雖曰醫療却 非治法盖小児臟腑虚則生蟲虚則積滞虚則肌羸虚 則腸滿何更利下若更轉動腸胃致虛此東疳虛證候 乃作無辜無喜 倍加 紫蘇娥梗 白术 陳皮 放難救矣小児疳樂此方十分靈驗 青皮 檳榔 普濟方 甘草 茅香學藿香學苦楝皮 乾葛 美没各史君子肉 香附子 白

金ケロルと 蘆薈九出聖治小児五疳面黃髮枯頭熱盗汗卧則合 瘦無力 地骨皮桑白皮 錢半服樂停一个時辰方可食乳食三歲已上每服 為九米飲湯空心送下亦得小児三歲已下每服 右吹咀水二盏薑三片煎八分去相通口食前服如 西飢即食土疳蟲蝕於口鼻鴻痢目疾無恒肌體贏 |錢上半月服去垂下半月去精實如咳嗽加人 卷三百七十九

Kr. Jane Kichin 服之 有蟲子自出即以粥飲下三九日三三歲已上加九 石為末都研令白 黄連 趙微 足 熊膽不蚺地膽炒去熊膽研如膽 九點入鼻中後以桃柳湯洗兒以青衣盖畏候 两十黄細蟬殼 細研玩 水飛過 煉蜜和丸如菜豆大每服以乳汁 普濟方 蝸牛殼炒夜明砂 細研龍腦細研胡半錢龍溫半分引 一分 蟾酥 辛 蜷娘

金分正是石雪 史君子九無疑濟治小児五府羸瘦腹脹下利不思飲 食 咸服五丸至七九用温米飲下日食運進 右為末拌令白 研大 聚栗米飲和九如麻子大每 香 熊膽研胡黃連 史君子用水和麵裹炮以麵熟丁香 無食子 **黃連無騎蘆舊所各熊膽敢者一些酥一鬼虧** 听我能 出年錢 夜明砂炒青黛两肉豆蔻仁研 卷三百七十九

12 t..) 13 ... 1. 1. 1. 1. 蘆薈九忠か治小児一切拍頭髮成穗面目姜黄鼻痒 石剉散每服三錢水一盏薑二片棗二枚煎食前服 | 乾爱食泥土心腹虚脹肚有青筋四肢壯熱 蘆香料两麝香細 夏蛐 黃者 當歸 蟆去足骸甲 替足銭人参 存出方仁 北柴胡 史君子爆甘草絲 一研胡黄連分木香分牛黄 細 川芎 白芍藥 生地黄 白茯苓 橘皮 Ē

金月四月石書 保童九出聖治小児五府為熱 石為末用猪膽汁和九如麻子 九二歳已上加九数服之 青黛細乾蟾頭炙微黃連去 龍腦 頭 久微性 明膽七 研能膽無好狗膽人牛蒡子 炒蝸牛殼炒史君子 卷三百七十九 大每服以冷水下 **盧普細熊膽研** 地龍敞牛

改定四軍全書 乾蟾丸 服以粥飲下五九量児大小加減服之 石為末都研令勻 香 後樂次 惠方治小児五拍不生飢肉出聖治小児五拍不生飢肉 分蘆薈 蟾骨更煎令熟爛後於乳鉢內并一枚用無灰酒一升煎其酒半升 八研了樂令勾以糯米飲和九如米栗大 n 肉豆卷二枚檳榔 研成黄 入蟾膏内和丸如菜豆大每服以 普濟方 半两去 膨粉 鄮 研一組銭 黄一錢黃連半两 銭 後赤對乳 助黄連 寸矣 酒 来却

胡黄連九出活勿治嬰孩小児一切疳候及一切虚痢 盛之以絕繁定湯煮半日取出切破袋子更入莨若 他樂無効而服此樂極効 粥飲下五九日三四服 石為細末取積猪膽两枚裂汁和末令匀却入袋内 史君子起木香 胡黄連 二錢重微炒黄丹 蘆薈 鉤藤 肉豆蔻炮桂 を三百七十九 錢重二味别研如粉入前藥 龍齒 白茯苓 麥 錢重

次定四車全書 1月 初見其輕延之日長後知其重告之無門是以疳痢皆 愈深或疳極而腹不利或熱盛而加作渴或煩躁四體 議曰疳之疾危發由於漸痢之後傳至於疳延久為逆 此等自是爱疑病家欲得便甦豈無性急更選取活展轉 由積毒驕恣口腹因虛以致虛因害而傷害醫工見有 下五七九幼者三九不學粥飲乳勿令飽能治一 和勻擠五百杆為九如菜豆大但是疳與痢用粥飲 種疳痢及無辜者功效非常 普濟方

能膽散出 惟宜服此 虚浮或飲食 白りて 細每服一 右熊膽等七味研令如粉黃連等六味再同研 熊膽 **党段根彰大黄** 明蛇膽 巴工黄連 録聖 濟 一字至半錢用飲調下早晨午間臨卧各 牛黄 時嘔吐常方不能安愈快劑恐越傷和 治小児二十四種疳 雄黄 一碎分炒 卷三百七十九 · 題歌去天麻 五靈脂 丹砂 蝸牛炒

服量光大小加减服之或以蜜為九如麻子 有淚滿口生瘡脚手細弱腹脇脹滿好喫泥土 九至五九 細辛業 史君子皮夜明砂炒白燕美炒各胡黃連 細黄并色 一分 蝸牛牧乾蝦基此用温水洗去垢慢火炙足炒各蜗牛牛乾蝦基二枚酒一升同熬成膏肠细辛去苗蘆薈研雄黄研蟾酥 檳榔剉蟬蛇去 并骨爪為末用色為度塩羅要 ,終録 治小児疳氣身體壯熱毛髮焦黃目 普湾方 盂 Ym麝香 人母服

金灰四月在書 青金定命九此雖濟治一切疳氣 右同研令与用酒煎猜猪膽膏九如菜豆大每服五 每服五九至七九米飲下不拘時候日三服 右除蝦蟆外搗研為細末入膏子和為九如麻子大 九至七九妳疳臘茶下氣疳丁香湯下腦疳黃連湯 胡黃連為末蘆會所各內豆熟是為未青黛所各 訶梨勒 五枚炒去麝香 冊門砂两塞吃僧 末紅雪研鶴風為末各 卷三百七十九 欠い回りにから 猪肚黄連九此於治疳瘡自孩提至弱冠潮熱發瘡乃 粳米上蒸十分爛取於臼中入蒸飲搗千餘杵 拍氣使然拍重食其肌膚空拍熱流注遍身熱瘡發 歇無已膽酥九相間服尤妙 湯下 石剉作小截少水和納猪肚內用線縫密頓在五升 卜急拍笋湯下食疳生姜湯下脾疳棗湯下腎疳盐 雄猪肚爭洗為八黃連去鬚淨 普濟方 Ī

具香散治疳脹乃虛中有積具毒與氣交并故令腹脹 金石四屋石書 倍之冠者又倍之仍以川芎生地黄茯苓茯神與之 得所眾手捏九如小豆大每服二十九米飲下童子 脾腹受濕腎水不能宣通故頭面手足浮腫 出於疳則出於熟熟則生痰須當識也 潮熱發瘡為虚勞皆比種病也用樂同前児童病不 調血清心熱多者間服生犀散方見前二十歲以上 二稜地我术 青皮 陳皮 卷三 百七十九 半夏廸 藿香

钦定四庫全書 胡黃連九專治小児毛髮焦落腹大氣喘肌體羸瘦學 肉情性不 食灰土生米寒熱往来下 石生姜素煎服雪脂用 苦楝 香美甘草於三 去白 前川棟的 宣連 益智仁 ·母又有孕心咬媚者乳 方加五 龍膽草分 有孕 普音方 枳殼 香附子 炒縮砂仁 1分半胡黄連 痢脱肛亦治咬蛹不長肌 青皮出史君 夜明砂 芜 **分名** 五

然拍九治小児五疳寒熱腹脹四肢贏弱 石為末類糊丸 香米大飲下三十九 小以意加減 青黛與最微妙殊砂細 為末都研令白熱植猪膽湯化破服三丸量児上 白燕美炒乾薑 大田父 研究香於大研入能層一錢 今 黄 她蛇皮灰銭脂粉 烏梅谷二 卷三百七 研雄黄 'n 細研胡黃連 細蘆

史君子九治小児五拍面色養痒頭熱爱敢胃氣不和 次定四車全書 膽礬九治消疳癖進食止寫和胃遣蟲 心腹滿悶宿食不消或時不利瘦熟無方宜常服 水下五九日三服三歲已上加九服之 **石為末栗米飯和九如菜豆大每服以粥飲或新** 明砂微青黛細黃連微炒豆卷表蘆蘆細研 前路一般磐頭一枚炙靡香 史君子 香 普濟方 没石子 熊膽研胡黃連 細一研銭 ŧ

每服十九米飲温水下不拘時 可太多恐服之難化太堅則入温水可丸如菜豆太 右同前膏和一臼中杵千下如未成旋入熟棄內亦 後樂夜明砂一蝦蟆灰性一两北寨根皮末半两乾入夜明砂一蝦蟆灰存五分北寨根皮末半两巴豆皮破之 訶梨勒上五味同炒令黑多三分東爛和後樂 史君子去皮枳實獲炒 黄連可以上四物熬令史君子二两枳實三两去黄連一以上四物熬令史君子二两枳實三两去黄連一 四物杵羅為細末三味候同炒乾同煎 和物教教令 三兩 應禁真者一銭大東四十 筒子醋

五疳保童丸 久足日奉 心言 **磨積丸專治小児疳積泄寫等疾** 石為末用栗糊為充如麻子大一歳児二十九 飯飲 下日二三服 青黛 熊膽分蟬殼去土黄連去龍膽草生乾蟾酒炙去 京三稜 麝香石蕪美 夜明砂洗裹五倍子生苦楝根 治五種疳疾 普濟方 陳皮去青附子樣我术皮青

金云四月月 香膽九治小児疳氣面黃肌瘦發熱多困好與泥土標 蚾肉 眉咬甲時伏土地並皆治之 石為未米醋糊為九如菜豆大每服三十九糯米湯 下茶湯亦可虛弱加木香虛極加附子疳極加癩蚵 皮同麥芽 炒 乾蟾人枝麝香研半十黄 好蛇 成雄黄 研天竺 焙乾雷凡者史君子肉焙蘆薈号上各畫夜雷九白 川欝金 巻三百七十九 胡黄連 神妙水醋煮一

生熟地黄湯治疳氣搖頭揉目白膜趣睛流汗合面而卧 欠こうりたいます 霧 肉色青黄髮立筋青腦熱羸瘦及眼合不開內生勝 米飲下不拘時候日三服 右為細末糯米飯為九如黄米大每服七九至十九 黄研熊膽 蟬蛇一分大仙子度焙乾為細末 生乾地黄洗熟地黄、洗净蒸川芎 肉豆蔻一枚 普齊方 Ī,

通治蟾酥九治諸疳殺虫止腹痛虚熱大效或因病後 金好四月全書 通泄太過成消 温服一方無當歸 右剉散每服二錢生薑二片黑豆十五粒水煎臨卟 陳皮 蟾蜍三箭 郡室胡黄連 地骨皮 枳殼粮去 川楝子 木香 甘草多當歸卷二 杏仁去皮川黃連 卷三百七十九 宣連 史君子敖龍膽草)去翳 用 **新無夷各** 半夏麯

欽定四庫全書 史君子ガ 石点ま 心為未用水浸蒸餅和九如麻子大每服以粥飲 九隨児大小加減用之 黄色仙靈脾 靈盖塗酥炙能陪細蘆首細訶梨勒皮 史君子 恵方治小児一 公猪膽汁九或糊九青黛為 没石子 一己上各 七粒 苗香炒 き三百によし 切疳神效 木香 胡黄連 両 Ī 阿膠 上點須 碎搗

蟾頭九治小兒五疳 毛髮乾枯瘦羸煩熱肚大脚 射香九些な治小児疳積多汗不思乳食 細 入每服一 石為未青黛等同研令勾以水浸蒸餅和九如菜豆 蟾頭 乾數做白附子製脂粉冊以上 天竺黄柳雄黄鄉味砂細研以上 **咸粥飲下一九** 女黄焦青黛細龍腦 細門)豆去油皮 再心 炒研 用裹 痈 壓 研細

設定四庫全書 無食子 石為末酒糊九如豆大三歲三十九米湯下無時 雅青黛 無食子思 熊膽平 蝸牛殼或者 九此聲濟治小児五疳 麝香鲜秦九半 半两青皮 两 熟用牛黄研麝香研丁香 分史君子 碎巴豆去心油美黄 各一分蟾酥 大焙 驚甲米 柴胡 炒

得日再服之 去肖 黄 四歲二九五六歲三九七八歲五九米飲一 総録 治疳殺蟲化食長肌肉退風熱 浸蒸餅為九如黍米大 無別两研 会家 蛇: 細 史君子 も三 た七十九 南豆 整題裏 煨去 一歲臨即乳汁 夜明砂

麝香金膽九此雖 治小兒一 欠この早とき 以通利為度 石為末續猪膽汁浸蒸餅丸如黍米大 九如麻子太每三歳以下者一九湯下五九至七九 石先研巴豆令細次用猪膽 其餘樂未搜和為九未就更用少軟飯再研得所 椰 鶴虱 蕪美 青皮 普商方 陳皮 切疳疾三服見效) 煨苦楝根分 枚取汁同研令匀旋 檳

金らせたんとう 肥児九良方 治小児消疳退黄肥児 老薑甘草湯下 胃虚木香陳皮湯下不思乳食素湯下 白紫蘇木瓜鹽米飲下 黄連 傷食不止藿香湯下 常服磨積 *两青皮 赤痢甘草湯下 一稜 巻三百七十九 陳皮 疳虫蝕腹痛史君子湯下 退拍熱麥門冬下 我才銘三巴豆 大枝 史君子 白痢乾薑湯下 各一两麥芽 赤白痢乾 腹脹 Ł

四膽九出 とこうったした 妙少時急傾將史君子川楝肉黃連燕美都一處以 粒研細末糊丸如黍米大每服三十九米飲一 石為末先取東引石榴根半斤對研以水三碗煮至 厚紙緊裹過半个時辰候冷揀出巴豆八粒止留: 龍膽去虎膽 出聖惠治小児一 一稜我水陳皮青皮神她麥芽同巴豆慢上 能膽 分 普濟方 一切疳 猪膽

黄連猪膽九一名蘆薈九出治小児五拍瘦弱不思乳 金片四月在書 許于鼻中腦上十指下部蟲聞樂氣皆化為水 半碗去滓以慢火煎如膏下諸樂末又熬九如菜豆 食 及下部者取一九以荆芥湯化為汁使児睡後點心 大用瓷器收之如遇諸疳有盡或楷鼻在手腕指甲 黃連結 蘆首研燕美 青黛丽 胡黃連半麝香研半 卷三百 七十九 檳榔一两各

致定四庫全書 --五拍良方出仁齋 石為末雄猪膽二箇取汁入酒打清麵糊為九 减米飲下甚效或用益母草紋汁稍稍服 **入母服十五九米飲下** 石為末以猪膽九如麻子大每服七九量見大小 柳斯麝香 蝦螂各半錢史君子慢去殼內豆為生 川黄連縣無夷取神勉炒麥蘖炒橋紅 直指方 普濟方 鷄心梹

夜明砂九點方治小兒疳症面腫項細腹肚脹滿四肢 金栗丹此聖濟治小児腹大疳瘦好食泥土泄利不 加减 羸瘦身上生瘡鼻流清涕頭髮稀躁日漸羸弱 石為細末煉密和九一半白麵不拘時候量児大小 好硃砂 膽一厚朴一夜明炒半蝉殼半河子為細木 丹丁香一乾蟾五枚雀酥川黄連各二两 研麝香料雨 き三百七十九 來 草 龍 調

文を日車をはる 煩執 服以薄荷湯下五九量大小加减服之 右為散以糯米內在猪膽中水煮熟取出九春米大母 能膽入 蝸牛微黄黑狗膽 細研牛黃細研 惠方治小見一出聖治小見一 切疳肌體乾瘦髮堅毛焦心神 普酒方 両 蟬殼炒蟾頭一枚炙 是精胡黃連 Ī

龍膽草散忠方治小児一 金グロノイー 驗 冷水下五九粥飲下亦得量児大小加減服之 右為末都研令白煉蜜和九如黄米大不計時候以 龍膽草去蘆木香 青黛了 丁香 麝香 麝香細研已 沉香研水銀以東內少許無魚膽 巻三百七十九 切疳日漸黃瘦無問遠近效 熊膽細蝸牛 黄蘆書細夜 半両 叨

蘆薈九忠す治小児八般疳疾 欠正日中心的 更吹少許入鼻中蟲子自出白色可醫黑色難療 右為末每服以粥飲調下半錢量児大小以意加減 右為末 和丸如米大三歲五九五歲六九腦疳即 塘頭一枚炒 麝香當門子所龍脳研珠砂馬研不見星犀角 蘆香研宣連去鬚水銀 木勢再樂一處研與或等分為舊大細研同草與記去土末 善濟方 瓜蒂為 陳皮 幸 蝸牛

金いたけんろ 香膽九些分治小児疳面黄 蝦基丸總 維治小兒疳氣 庠黃連湯下肺疳即喘陳皮湯下食疳即吐鴻生薑湯 右為末三歳三十九作九如小豆大米湯下 目溢甘草湯下骨疳即爱卧冷地茶清下奇妙极多 下脾疳即羸瘦棗湯下氣疳即肚脹青皮湯下肝疳即 竺黄 乾蚵蚊酒浸炙黄青黛 史君子分一定粉 青皮络一麝香二銭 卷三百七十九 欠こうらい 金膽九 無疑治小児五府心脏衛泊肝脏風疳肺 四服 滑府腎臟急疳皆治之常服 樂末為丸如栗米大每服五九至七九米飲下日二 石用蝦蟆燕美為末積猪膽二枚酒煎成膏和其餘 未銭 二為 去般麝香研黃連 丹砂 多黄為末胡黃連一枚 用頭 歽 普齊方 一錢半夜明砂 地龍去土木香 白旗英 夕豆

吹鼻散出聖治小児一切疳及有名瘡疥孩子頭禿腦 金万四月全書 疳無辜疳或時候閉並用 右為末燒栗米飲丸如麻子大荆芥湯下三九至五 九量児大小加減服 香部少牛黄分丹砂碱是大黄丹虎睛研 蟾酥字胡黃連 史君子 蝸牛殼分青燻錢人糞灰錢蚺蛇分蘭香好龍腦 蝦蟆灰分甘草末分地榆末 麝香研細各 卷三百七十九 熊膽所各木香钱麝

改定四車全書 · 普爾方 · 中最微妙若子出乾後炒令黄黑色方可 · 中最微妙若子出乾後炒令黄黑色方可 · 中最似的 · 好成及灰分雄黄川研天竺黄川研麝香料 金蟾九思方治小児五班頭熱眼漩胸高脚細頭大 脹面黃鼻乾騰悸盗汗肌肉羸瘦寒熱不定宜服 出皆如涤色切忌五辛 石都細研每日取少許吹入鼻中其患漸差其髮生 久令焦黄 胡黄連 分地龍器冊碌砂

蘆薈九 每 服之 右為細末都研令与以糯米為飲調和丸如菜豆大 再 虫虫去骨 嬰方治小児疳氣腹急 服以粥飲送下三丸或四五丸量兒大小加減 **分猪膽糊丸小豆大三歲兒十九米飲下** 氏方治府殺蟲子和胃止寫 去骨一两巴豆去皮心油用酒浸炙黄口豆土粒炒黄 檳榔 卷三百七十九 黄連 西燕美皮青皮 陳

次定四車人動 無時服 石為末煉塞為九如麻子大每服五九空心午後 石為細末栗米飯和丸如菜豆大米飲下一二十 東連九 総録 治小児五疳 胡黄連 胡黄連 蛤蚧縣牛黄研犀角屑 赤殺人勿用青皮去鶴風尚炒已虧香二錢破開白者住青皮去鶴風微炒已虧香二錢 为豆蔻仁 大黄 細所做炒雄黄所加粉 普灣方 燕美去雷

楊子九比方治小児疳腫脹因虚中有積腹肚緊脹頭 金りて 服温水下 皮煎湯下 面虚浮 右為末飛羅麵糊九菜豆大每服十五九紫蘇桑白 半炒五靈脂 雑筍で 吞紫霜九治疳脹肚皮緊 1:11 つ炒 一方大具香散加五靈脂末煎紫蘇湯調 **神**陳皮 赤茯苓 莲术 照各本香二銭 巷三 百七十九 青皮 好檳榔 里奉 仁取

史君子九出醫方治小児五疳下利能飲食不生飢肉 久下日日八十二 或抓頭揉目或頭焦筋青下痢頻久而不痊轉羸瘦 金九出經 验治小兒五種疳氣面疾黃,肌瘦不食乳 方煎陳皮湯乳前下香名胡黃連九 並皆治之亦小児便白濁 **右為末栗飲為九黍米大每服十二九米湯送T** 黄連 三两丁香 肉豆蔻两 普濟方 木香 蘆薈 麝香各一 厚朴 没石子 冯. 胡

金いたいたんかって 實者取而後補虚者補而後取 淡豆豉丸治小兒面色麥黃不食腸脹如鼓或生青筋 右為細末續猪膽汁和九麻子大空心食前米飲下 日漸贏瘦此是乳母未斷乳而又致孕其乳為交乳 相之孫子新所藏疳方最多未若此簡而效者 向上五服若中下旬則弗効が云此得於上蔡朱丞 三九日進三服即愈更量嚴数加減與之重上旬頭 川棟肉景等 卷三百七十九

じんこうりきへいたう 脂連九出仁蘇治五府潮熱肚脹髮焦 桃柳方好選治小児疳服諸樂後用此法助之 疳潮熱謹勿用大黄 右為末續猪膽汁丸麻子大每服十五九米飲一 右研与如泥九栗米大每服十九薑湯下無時服 下魚凍汁病根除矣急與補脾 胡黄連半五靈脂而 淡豆敢杜巴豆一粒器 普濟方 #

消疳麝香九出的治府勞肌熱面黃髮穗骨立贏弱減 鼻中日二度一方有 右取棘針瓜蒂等分搗細羅為散每服用泰粒一 **珀蟲自出為驗** 石剉碎水両大碗煎数沸 散出聖治小児一 桃枝平柳枝 澗並宜服之 棘刺花 切疳 卷三百七十九 通身浴児畢用一 青衣盖

欽定四車全書 ! 右以糕糊九黍米大每服十九米飲下食後即各 服消疳化蟲長肌肉止疳痢療温瘧尤勝 凡癲癇 児五九至七九人参湯下日進三服奇効無比止後 於本方中加後藥 石為研細末滴水為丸如黄米大一歲児三九五歲 宣黃連 青皮 椰 麝香研蘆首 胡黃連為末各 - 各等 陳皮 史君子肉 木香 普濟方 櫥

香橘九治小児疳瘦泄寫無時不思飲食 香丸出聖 驚風五疳三蟲服之立效 蛇動作形神枯率久利不 右為末蜜丸櫻桃大米湯化下一九 止調護最難用此如神疳樂雖多功效皆不及此 母丁香收七胡黄連半商味砂細研熟業 半两陳皮 木香錢丰 史君子一 內訶子肉煙 治小兒一切疳脹 起三百七十九 之東安縣 甘草

欠足の事人生 石為末入諸藥蝦蟆膏內和九如栗米大空心粥飲 蝸牛 五九日晚再服 分猪膽取汁牛黃分蝦螂净入猪膽汁更熬成膏 恵方治小児 研能膽可 末都研令勻用猪膽汁和在如菜豆大每服 九枚虫蛇條乾蟾一枚截四十已化 研入夜明砂微 切拍 普添す 研心帶 都境為正取前牌人 里三 灰前 一分 細用

通 保童九出聖治小児一切打體瘦皮乾毛髮焦黃心熱 米大每服以冷水下五九量児小大加減服之 煩渴殺五疳宜服 温水下三九量児大小加減服之 石以青黛等細研次下猪膽研令勻煉蜜和九如黍 青黛和熊膽分黑狗膽也麝香外蘆會 枚蟾頭灰一蝸牛一分炒令人银一分同東肉研 出聖治小児 卷三百七十九 切疳吹鼻 分無魚膽

保生九世聖治小児五疳能克肌膚悅澤顔色宜常服 以この目とき 此 石為細末都研令白每用少許吹鼻中當有五出 連分 杏 彰與莫一枝於小確子內以无其良微妙去 黄連一分白磐灰一分赤小豆~ 麝香細夜明砂粉甜草麼偶紙炒胡盧子 分乾蝦養灰細研麝香細研熊膽細研胡黄 普灣す 43

金月口月月日 牛黃九出聖治小児五疳百病無辜一切泄測肌膚臨 瘦 九量児大小以意加減 右為末以軟栗飯和九如菜豆大每服以粥飲 牛黄細研代赭細 胡黄連 泥 巴丘紙表壓去油頭 虎睛一角微炙碌砂一分杏仁一分为浸分去 虎睛一角微炙碌砂一分杏仁一分为浸黄细研代赭细研赤石脂研細牡蠣粉分人参 熊膽細研己上 を三百七十九

治大人小児腹中諸府濕 治小児疳後虚熱尿並見腫良な驗 治小児腹中疳出本 菉豆大每一歳以冷水下一九 石件樂除杏仁巴豆外為末都研令与煉塞和九如 ういここ 右以蜘蛛燒熱啦之 右媽火煤灰為末清油調塗尿莖上并治腹大 用羊尿煮湯灌下 背部方 五五

金坛四月全書 蒸鷄九一名鷄內煎治小児拍勞骨蒸潮熱盗汗瘦弱 又方此經驗以朴硝為末鷄子清調全尿並上 至五日後去毛令净於臀後開孔去腸肚淨拭乾 右為末黄雄鷄一隻重一斤籠之專以大麻子飼之 腹急面黄飲食不生肌內日哭夜啼多渴少食 黄芩 史君子紀去散 黄連門柴胡門無夷 鶴風科奉光 樂於鷄腹內以線縫之取小飢先以黑豆鋪飢 卷三百七十九

欽定四庫全書 | 10 香黃九些女治小兒疳黃腹大潮熱心躁臟腑不調食 盖好自日出時蒸至晚候温冷取鷄淨肉研和得所 物不化飲食雖多不生肌內 以意加减米湯下無時服如十五歲病者以温酒送 如硬入酒麵糊同樂末為充如小豆大二歲十二 下忌猪肉一方麥門冬湯下空心臨卧服 學三寸安鷄在 甑中四旁以黑豆 圍裹上亦以黑豆 肉豆蔻 普湾方 青皮 陳皮

沉重 右点末 苓等分 喇 **分糊丸小豆大 三歲用十九米湯下** 議活 去酒 骨浸 治小児府熱虚煩作渴不思飲食四體 炒 錢煎麥門冬湯調服不拘時 き三で七十九 川當歸 柯 **麸浸去** 扨 平根去泥土 作 tÝ

通神 次之四車全書 弱 肉豆蔻 胡黄連 直指方治小男 經驗方治諸府通用 出仁齊 五靈脂 普灣方 錢炒各 夜明砂焙縮砂 畧煨 膿血日加 橘皮 青

治小児疳 疳吸不能發聲 且指方 銭 石以肥兒丸每服十五丸用蘇合香丸 石用茺蔚子盆母草 石為末雄猪膽二枚取汁和藥糕糊九麻子大每 十九米飲下疳勞瘦弱本方加當歸 蝦養日東多焦 卷三百七十九 稍服 錢半川芎二 粒

欠かり手という 猪肚丹如鹭方治小兒疳瘦盗汗多倦少力大便有五 靈砂丹妙選一治因嗽成拍最宜服之 曾經大效 右為細末粳米和九如黍米大每服十粒煎人參湯 靈脂末各少許菖蒲煎湯調開下 下量兒大小加減 香 蘆薈 少町菩薩 杏仁奶去皮头 五靈脂 普濟方 胡黄連名一

金分口た人 青金九 蒸蒸熟去白芷不用却入諸藥縫合再蒸如泥取出 同猪肚搗二三百下成膏圓如黍米每服十九米飲 下不拘時候量兒大小加減 石為末積猪肚一箇洗凈先以好香白芷二両内肚 豆蔻 川黄連 息方治小兒一 蛾矣黄焦 夜明砂袋鶴虱半雨黄連 **瞥甲聚白燕夷各半** 胡黄連 切拍 巻三百七十九 蘆薈 肉

えん ううう しょよう 通頂散出聖治小兒一 抄内入鼻中有虫出似馬尾長三二寸便去病也 石為散入麝香同研令勾每使時候兒睡着以指甲 石為末研入麝香令白煮棗肉和九如梧桐大三歲 下以粥飲研破一九服三歲以上相度加九服之 連去鬚田父人麝香細研定粉或 白磐灰分赤小豆也 黎蘆蘆頭 丁香丸十黄 研腽肭臍潤剛 我们看重聚矣熟去肉各一 一切拍 普齊方 以熱絹裏 取猪 甲丸 两

肥兒九出在治小兒疳病者多因乳食太早至此或因 延命牛黄丸出聖治小兒五哲羸瘦 日三服 温水化二九滴両鼻中令嚏五七聲再温水下三九 右細研用温水浸蟾酥和九如黍米粒大每服先以 入患臟腑胃虚蟲動日漸羸瘦腹大不能行好食泥 牛黄 為未 丁香末 蟾酥外三十枚丁香一分蟾酥牛 雄黄 麝香 卷三百七十九 龍腦已姓名瓜蒂

欧定四軍全書 暫甲散出楊 治府勞骨蒸 進三服大小以意加减忌生硬冷物一方猪膽汁 石為末糊九小豆大三歲兒十九米湯送下無時日 工髮監發熱面無精光此藥殺蟲 黄連 地檳榔銭木香銭三 童子小便奎炙黄連九肋湯浸洗用 神勉以各史君子 也去 麥葉炒各內豆葱 普齊方 بد **黄者家白芍** Ŧ 南

宫氣方此政和治小兒一切疳疼日漸羸瘦 蘆着九出聖濟治小兒氣疳 淀漸與喫令一日盡為住一方用蜜同蒸名蝸牛煎 右為末每服二錢水牛盞煎至三分去滓不拘時 上蒸下饋時坐甑中裝飯再蒸即已取出細研如水 有塵滓晒乾内酥於殼中以瓷蓋盛之紙糊蓋面飯 取舊死蝸牛殼七枚皮薄色黄白者水淨洗不得少 熟地黄 地骨皮 曹歸蘆 人多半商 次主四車全馬 啊 肥肌丸は行治小兒拍瘦贏手足枯細腹筋青食不 肌 右為末以糊九如麻子每服二三十九米飲下 荆芥湯下三九至五九二歲以下兩九 右同研与入猪膽為九如菜豆大每服日空心臨 膽研麝香研末各 蘆薈所釣縣 苦寒雨龍膽草 銭 白一两雄黄 普濟方 青黛為半蟾酥研 포

龍山九 氏方治泊将 樂相間服 右用鼈血一 炒乾透去菜更并血只用二連夾餘樂杵末栗米粉 石為末以糊九如麻子大每服三十九米飲下 胡黄連 參科川芎 燕夷 核川芎 盛吳茱萸 川黄連各半 面 各 卷三百七十九 両拌和二連淹一宿次早 史君子

木香九出致氏治小兒冷拍多渴好睡冷地煩躁啼叫 欠を日まれた 便滑泄百樂不效者是也 右為末煉塞九麻子大薄荷湯下一歳十九加至三 飲食不進漸瘦其候難明上件證候有若熱證但大 糊九如麻子大每服二十九食前熱水下 木香 青黛别檳榔 兩净麝香沙以與蛛盆中所賣自死者焼灰存性矣一麝香少以與蛛三隻須用街市問絕繁連皮 普濟方 白豆兔二钱半續隨子去 五十二

金グルト 金靈散出全治小兒久患疳疾體虚不食及皆病候 拘時候量兒大小加減 右一處研与糯飯和九黍米 枉骨侄醫者不識謂之五軟 草勢部內鹽泥固濟炭火燒留家子包舊五枚水浸去骨用師一節頂頭 宿出火毒 胡黄連 出置地 蝉殼 妙選治肌瘦面黄胸高脚細出醫方治肌瘦面黄胸高脚細 研為細末 成砂井 |雨蛇蛇焼灰地龍炒一天空 巻三 百七十九 ンド雨麝香 大母服十粒米飲下 煙息為 銭 一黄

椿白皮九出本治小兒疳 後 **先如梧子大十歳三四九量数加減一九内竹筒中** 以椿白皮日乾二為末海栗米去泔研濃 人鼻中度差服丸以飲下 普齊方 五三

青金丹日名全命治小兒一切疳神秘百發百中極驗 金分四月百十 す 四分去滓放温服量大小加減 石為末同乳香拌与每服一錢水八分人參少許煎 取蟾涎至黄昏山野寒三枝仍以此 能甲塗酥乳香石半 漏蘆一沉香 34 昏却解放勿令傷損取其涎 蟾肚口 中須繁定令倒懸之以生銅器勿損傷以胡黃連一寸許當以線以端千日午時取之絕子繁雙脚 牛蒡子做訶子肉 微炮安息香 盛繁稍

欽定四庫全書 以温水下五圓量兒大小加減服之若藥乾便以乳 香一分和研令勾圓如蒙豆大生銅合子盛之如有 小兒患一切疳先令暖漿水浴以軟帛子拭乾後便 右用淹瓶一箇內藥瓶中密盖黄泥固濟以炭火焼 汁浸化破與食須臾似醉勿怪此是藥力蟾涎較 之通赤去火待冷打破瓶取樂研為末用蟾涎并麝 用白净者是雌蟾也青魚 猪牙皂荚 雄黄上各 普湾方 なこうじとひ 蘆薈 蟬殼

青黛散出聖治小兒一 田父九忠方治小兒一 黍米大每服以粥飲下三九量兒大小 以意加減 石為末先取半両用醋 和藥較硬即便添入乳汁相和研為妙 秦如不嚏者必 死矣 潦年兩捣碎**砂**手 田父瓜及堂蛇蛇係母丁香 一切疳 切疳吹鼻問命散如嚏多疾輕 麝香細研俱 **鍾熬成膏後入餘藥和九** 化 人 夜明砂 微一炒分 乾

飲定四軍全書 蘆薈九割か治疳氣羸瘦面黄痿腹肠脹滿頭髮作 舌斷爛黑常服長肌退黃殺蟲進乳食 孫鼻咬甲好喚泥土痢色無定寒熱往来目澀口臭 石為末散每用少許吹在鼻中得嚏則吉 大皂角燒存性青黛一分蘆薈 蘆香細研黃連去鬚 研細細辛再瓜蒂 人来一两人烧存性為

蛇皮九忠か治小兒五疳形體羸瘦 日三服量兒小大减增服之 右研勻用湯浸蒸餅和九如麻子大每服三歲兒 石為末以糯米飯和九菜豆大每服以粥飲下五九 二十九不計時候温米飲下更量大小加減 少地龍 恵方治小兒五疳面色黄瘦り體 以分乾蟾 · 庆麝香細研車蟬 卷三百七十九 今黄焦青黛 去翅足 両 研 夜明砂

X TUBER WHITE 痢 看多少微煎過下三九量兒大小以意加减服之 乳食不能消化眼澀痛胸膈痰涎愛食酸鹹常多寫 吐逆不止及水寫生薑湯下三九眼疳羊肝血和酒 甘草湯下三九食府寫血成亦白者以新水下三九 石為末用牛黄丸如菜豆大若小兒心臟疳煎燕菜 齊頭一枚塗酥虧香一分 胡黄連 普齊方 五

金次でたる言 麝香九出我治拍氣廳瘦白蟲作 雄黃九治小兒五疳羸瘦毛髮乾黃與食不恒 右為末都研令勻以猪膽汁和丸如菜豆大每 雄黄硫麝香細蟾頭一枚酥胡黃連 九以新汲水下日三服 胡黄連 分、碌砂雅過水 白燕美去皮各黄連 巷三百七十九 蘆會細 歳

麝香九點な治小兒諸疳消瘦骨熱面黃爱婴泥土灰 ていつき こいう 服化蟲 炭茶紙髮稀焦黄小便白濁口鼻生瘡腹急氣粗常 石為末猪膽為九小豆大三歳兒十九米湯下 凡五歳已上者可十五九二十九無時 石為細末麵糊為九如菜豆大米飲下五七九至七 蚵蚾屑炙黄胡黄連 二錢麝香字 普齊方 蘆薈為半史君子炒雨 五十七


免与四月全書 猪肚九氏方治骨蒸疳勞人羸瘦神致 肥兒九出話治小兒一切疳氣肌瘦體弱神因力乏常 服殺蟲鴻疳開胃進食 服大小以意加減 取出細研猪肚為九如麻子大米飲下不計時日三 石為末用猪肚一枚入樂於內麻線扎定口将肚煮熟 甲九肋者童子小 木香料宣連 生地黄 卷三百七十九 青皮各 銀柴胡煮

 欽定四庫全書 然既知其虚乏又親見其證不得良方以何治之雖獲 議曰號疳積痢各分證候用樂今有小兒患疳虚困又 熱毒差重皆係猜之久滞雖人積因虚受之其病難療 作痢疾二候相加最為患重疳痢併行臟腑虚乏之極 石為末水煮細麵糊為九麻子大每服三五十九温 黃連上鬚川棟子肉两炒川芎再陳皮 香附子 木香錢 普濟方

肥肌良方亦名佐勝六神九嬰な治小兒羸瘦膩腑怯 其方不審其候亦難療也必須脉與病同樂與證對醫 右為末以聚肉和凡如麻子 運巧扶而起之乃得安然胡黃連九無以加也 下食前服或 爛飯丸如黍米大一歳二十九一方以 弱泄利虚滑乳食減少引飲無度心腹脹滿 放冷部子核去取出可是提去 丁香 木香 史君子為半蘆薈 **向且卷去数各半两** を三 モセナカ 入每服三五九温米 今姓熟為度 軥 飲

次之四軍全書 五疳消食九部方治小兒五疳八痢腹臟蟲蝕療疳勞 顏色長肌膚 及走馬牙疳齒疼唇爛肚大青筋此樂大能進食悅 猪脂鎔入雞子一 下八胖也 即令休息鴻疳如神湯氏一方不用棗肉為丸飯飲 箇碎和炒熟令兒食盡吞下上 炒黃連去鬚衛紅 普濟方 龍膽草 五九

蝦螂九部か治小兒五疳八痢腹脹面黄肌膚瘦碎時 米湯吞下不拘時候量兒戲數加减 右為未栗米糊為九如栗米大每服二三十九空心 長肌肉多生瘡癬大便無時小便如泔嘔吐乳食痢 作寒熱不思乳食愛喫泥土禄鼻咬甲頭髮作穗不 色無定或學交好漸黃瘦變成疳疾並宜服之 史君子炒皂角片為青黛研二龍膽草 卷三百七十九 襾



普濟方卷三百七十九		金次以乃人可見
七十九		卷三百七十九
		_